

Après l'installation d'une couronne ou d'un pont

Afin de favoriser votre guérison, nous vous conseillons d'appliquer la marche à suivre décrite ci-dessous. Veuillez toutefois prendre note qu'il est tout à fait normal de ressentir un certain inconfort après la chirurgie et d'avoir le bas du visage enflé.

L'installation de ponts/couronnes se fait en deux rendez-vous. Lors de la première visite, nous prenons les empreintes des dents à remplacer. Ensuite, nous procédons à la pose de couronnes ou ponts temporaires afin de protéger votre dentition avant que les dents de remplacement soient prêtes.

Jour du traitement

- Prendre la médication prescrite, au besoin.

À éviter

- Consommer des liquides chauds lorsque vous êtes sous anesthésie.
- Manger des aliments collants ou durs (gomme à mâcher, bonbons).

Alimentation

- Mastiquer du côté opposé.

Du lendemain jusqu'à la guérison complète

- Se brosser les dents normalement, en utilisant la soie dentaire avec précaution pour éviter de faire tomber la couronne temporaire.
- En cas de perte de couronne temporaire, nous vous invitons à vous rendre immédiatement à la clinique pour la recoller. Si vous tardez trop, l'installation de la nouvelle couronne risque d'être plus laborieuse et les autres dents peuvent commencer à migrer vers l'emplacement libre.

En cas de douleur ou pour toute question, veuillez nous téléphoner au **450 447-4055**.